

De novis Cicindelidarum speciebus

scripsit

Dr. med. **Walther Horn.***Pogonostoma Laporti.*

Pog. pusillo G. Lap. affine, differt vertice magis angustato, in disco postico frontis fovea profundiore impressa; elytris paullo subtilius et ante apicem vix densius punctatis, totis dense sed brevissime griseo-pilosis, apice singulo solummodo ad suturam leviter exciso, angulo suturali recto, laterali sat obtuso (dentibus nullis). — *Pog. minimo* Flt. iterum affine, differt statura robustiore, fronte planiore et postice profundius impressa; media prothoracis parte latiore (praesertim postice), strangulatione basali valde profundiore; elytris griseo-pilosis, minus dense subtiliusque punctatis, apice singulo non simpliciter rotundato sed incisura levi suturali affecto. — Long. 6 mill.

1 ♂, Madagascar: sub montes orientales a Sikora olim captum.

Palpis corpori concoloribus; femoribus fere nudis (sparsissime brevissimeque pilosis); prothoracis parte media cylindrica, lateribus fere rectis, strangulatione antica posticaque profundis, basi perparum latiore quam apice.

Pog. flavomaculatum m. differt statura valde graciliore; prothorace multo angustiore longiore, supra densius subtiliusque transversim striolato; elytris a medio ad apicem subtilius rariusque punctatis, paullulum micantibus, coloratione etc. — *Pog. Schaumi* m. differt elytris non tantopere griseo-pilosis, sed densius et pone medium grossius punctatis; prothoracis lateribus minus rectis; palpis labialibus pallidis etc.

Die dichte, kurze Behaarung giebt den Fld. ein mattes, graues Aussehen.

Tricondyla (Derocrania) Halyi.

(W. Horn, D. E. Z. 1899, p. 132.)

Differt ab omnibus huius subtribus speciebus elytris valde rugatis ut in *Tricondyla granulifera* Mtsch. (*femorata* Walk.). — Long. 20 mill.

1 ♂, Ceylon.

Statura paullulum *Derocraniam scitiscabram* Wlk. (*Dohrni* Chd.) refert, sed multo angustior longiorque. Capite (quam in hac specie)

inter oculos profundius excavato, his magis prominentibus; prothorace longiore, praesertim parte crassa postica (quae haec de causa paullulum angustior videtur), supra densius et profundius transversim striato; elytrorum forma fere ut in *Tr. granulifera* Mtsch., sed paullulum angustiore et in medio disco minus convexa (sat applanata). Colore supra subtusque rufo-purpurascens er-brunneo; fronte antica, malis, labro viridi-metallice tinctis; femoribus, antennarum articulo 1^o 2^oque et 3ⁱ—4ⁱque apice rufis; tibiis, tarsis, palpis nigris; abdomine brunneo-metallico.

Species haec superba Directori Musei Colombensis (Dom. Haly) sit dedicata!

Tricondyla (Derocrania) longesulcata.

Derocr. Honorei Flt. ♂ similis, labro inter dentes laterales basales transversim impresso; capite minore, fronte inter oculos minus excavata; et antica et postica thoracis parte longiore angustioreque: illa valde constricta cylindrica supra evidentius transversim plicata, hac magis parallela gibbiosioreque; elytrorum parte basali angustiore, profundius granulato-punctata, parte inflata globosiore, profundius et multo regularius longitudinaliter impresso-striata: sulcis magis basin versus initium capientibus et fere usque ad apicem ductis, 6—7 medialibus omnino regularibus parallelis, ceteris lateralibus fere aequae irregularibus atque discoidalibus illius speciei. — Long. 11 mill.

1 ♀, Madikere (Hindustania meridion.)

Ich vergleiche das ♀ mit dem ♂ von *Der. Honorei* Flt., da das ♀ der letzteren ein noch erheblich kürzeres und plumperes Halssch. hat als das ♂. Die Differenzen im Bau des Prothorax der neuen Art sind sehr bedeutend. Die hintere Fld.-Sculptur ist wegen der auffallend scharfen parallelen Furchen sehr interessant. Die Fühler fehlen meinem Ex. Das ganze Thier ist schwärzlicher gefärbt als die Fleutianx'sche Species.

Therates rugulosus.

Th. cribrato Flt. affinis, labro flavo lateraliter angustissime brunneo marginato; fronte antica?, orbitis? differentibus; fronte inter sulcos longitudinales centrales angustiore, vertice pronotoque (non leviter sculptis) levigatis, huius parte intermedia brevioris; elytris paullo longioribus, postice ♂ longius angustatis et solummodo extremo apice (singulo) perparum rotundato truncato, tota superficie grossius multoque densius sculpta, punctis saepe hinc inde confluentibus (ut interdum rugae plus minusve longae transversae aut obliquae formentur), in

quarta parte apicali puncta sat sparsius collocata paulloque minor quam antice; macula centrali flavescente nulla; corpore toto supra cyaneo; meso- et metathoracis sterno brunneo-testaceo, et tibiis et tarsis (solummodo apice extremo cum horum articulis 2 ultimis totis brunneis exceptò) flavescens. — Long. 6—7 mill. (sine labro).

1 ♂, N.O.-Sumatra: Tebing tinggi (Dr. Schultheis collegit; Dr. Kraatz dedit); 1 ♀, Java (?).

Labro fere ut in *Th. obliquo* Flt., sed parte centrali antica subtilius dentata et rectissime truncata, marginibus lateralibus brunnescentibus; fronte centrali plana, nullis impressionibus ornata, angustiore, orbitis magis verticaliter erectis (ut oculi minus lateraliter promineant); strangulatione verticis deficiente, hoc multo brevior: profundius in prothorace posito; pronoti sulcis transversis ipsis leviter punctulatis; elytris angustis parallelis, ♀ apice (singulo) extremo sat recte truncato (angulo externo valde rotundato); primo antennarum articulo (ceteris obscuris), palpis totis (articulis ultimis vix obscurioribus), trochanteribus flavis; prothoracis episternis cyanescentibus, illis meso- et metathoracis cum abdomine nigro-brunneis.

Das einzige (typische) Exemplar von *Th. cribratus* Flt. meiner Sammlung hat leider nur einen halben Kopf und kann ich daher nicht viel im Vergleich mit dem meiner neuen Art angeben. Das longitudinale Mittelstück der Stirn ist bei letzterer auffallend schmal (höchstens halb so breit wie bei *Th. Chennelli* Bat.) und zeigt keinerlei Impressionen (abgesehen von den Rand-sulci). Die Fld.-Sculptur ist rauher als bei irgend einer anderen bekannten Art und nimmt von der Basis bis kurz vor dem deutlich ausgeprägten Eindruck vor der Spitze in nichts an Rauheit ab!

Beim ♀ sind die Schienen in größerer Ausdehnung leicht bräunlich.

Therates Kraatzi,

Ther. Chennelli Bat. ♀ (♂ mihi deest!) *similis, aliquanto minor; capite parvo, vertice non inflato valdeque angustiore, fronte centrali inter orbitas minus lata et (parte antica perparum tuberosa levigata excepta) leviter longitudinaliter striolata (ut orbitalium basi), sine impressionibus punctiformibus, orbitis magis verticalibus; prothorace brevior; elytris opacis paullo densius punctatis, pone medium sculptura non tantopere evanescente (sed punctis valde subtilioribus rarioribusque quam antice), signatura: macula magna centrali rotunda pone medium posita, lunula lata humerali oblique curvata valde descendente*

et cum illa fere connata, basi tota angusta, stria tenui suturali in quarta parte antica testaceis (apice ipso ut in illa specie flavescente); capite pronotoque viridi-aenescentibus nigricantibus; elytris brunneis; abdomine obscurato; antennarum articulis 2^o—11^o brunnescentibus, 2ⁱ—4ⁱ apice nigricante. — Long. 7 mill.

1 ♂, Penang.

Capite profundius in prothorace posito quam in *Th. Fleutiauxi* m., fronte antica verticali leviter transversim striolata, inter orbitas angustiore etc., his paullo magis verticalibus, vertice angustiore; prothorace brevior multoque magis lateraliter curvato; elytrorum sculptura grossiore etc.

Die Umrisse des Kopfes und Stellung der Orbital-Platten erinnern sehr an *Th. obliquus* Flt., doch ist die centrale Stirnpartie zwischen den Orbitae breiter etc., die ringförmige Vertex-Einschnürung fehlt etc. — Die Zeichnung auf der vorderen Fld.-Hälfte ähnelt derjenigen von *Th. Chennelli* Bat. var. *concinna* Gestro, ist aber breiter und die Lunula nach unten-innen länger und schwach verdickt, der Nahtstrich von der Sutura nur durch eine feine schwärzliche Punktlinie getrennt.

Therates Gestroi.

Th. Kraatzi m. ♂ affinis, differt fronte tota ut vertice levigatis, inter orbitas latiore, his planius collocatis (basi rugulis 3 brevibus longitudinalibus ornata), vertice paullo minus constricto; elytris nitentibus minus parallelis, in medio et postea dilatatis, sculptura fere eadem, signatura: lunula humerali angustiore et brevior (fere ut in *Th. Chennelli* Bat. var. *concinna* Gestro), stria sat angusta paullulum curvata testacea in angulo basali juxtascutellari collocata (suturae solummodo brevissime sequente nec cum lunula in basi ipsa connata), macula obliqua discoidali magis antice (vix pone medium) posita, apice non flavescens; coxis posticis basim versus obscuris; pedibus ut in *Th. ruguloso* coloratis. — Long. 7 mill. (sine labro).

1 ♀, Lakhon (Harmand 1878 collegit): a Museo Paris. mihi data.

Labro et primo antennarum articulo (extus nigro lineato) flavis, secundo nigrescente, ceteris deficientibus.

Von *Th. Chennelli* Bat. schon durch den kleineren Kopf und vor Allem nicht aufgeblasenen Vertex (♀ a ♀) verschieden. Die Orbital-Platten sind noch etwas flacher gestellt, die Stirn dazwischen nur wenig schmaler und ohne die 2 eingestochenen Punkte. Die schräge Centralmakel der Fld. ist in der Richtung nach hinten,

unten und suturalwärts. — *Th. Fleutiauxi* m. hat einen centralen Eindruck auf der Mittelstirn und einen im ganzen schmälern Kopf, da die Orbitae weniger flach nach außen gerichtet sind. Das Mittelstück des Prothorax erheblich schmaler und viel weniger kugelig; Fld. länger, paralleler, etwas feiner punktiert; Zeichnung etc. — *Th. obliquus* Flt. hat die Mittelstirn zwischen den Orbitalplatten viel schmaler etc. etc. — *Th. tuberosus* Flt. weist viel steiler gestellte Orbitae auf, trägt einen centralen Eindruck hinten auf der Mittelstirn etc. etc. — *Th. Rothschildi* m. hat die Mittelstirn und vor Allem den Vertex viel breiter, weniger entwickelte Orbitalplatten etc. etc.

Therates Maindroni.

Th. Batesi Thms. ♀ *similis, forma staturaque tota eadem, sed partibus orbitalibus levissime usque ad cristam superiorem striolatis; elytrorum apice (singulo) rotundato-truncato (angulis non acutis: spina suturali nulla), signatura: tota quarta parte antica (marginem versus paullo angustata), sutura ipsa angusta, macula media lata transversa (brevis) medialiter paullulum dilatata, a margine late distante, suturam fere attingente in medio longitudinis collocata plana (non tuberosa!), tota parte apicali pone angulum lateralem externum rufescente-testacea; elytris ceteris purpureo-violascentibus; 2^o—11^o antennarum articulo clarius brunnescentibus; parte sternali meso- et metathoracis, coxis, abdomine testaceis.* — Long. 8 mill. (sine labro).

1 ♂, Borneo occident. (Pontianak: 1898), ab amico Maindron mihi datum.

Fronte antica et vertice levigatis, parte intermedia centrali anticem versus levissime (sculptura oculo armato vix percipienda) rugulosa et in medio impressione arcuata transversa ornata, vertice non (ut in *Th. Chennelli* Bat. ♀) inflato; media prothoracis parte valde globosa. — *Th. Gestroi* m. ♀ differt parte centrali frontis interorbitalis latiore, orbitis multo planius collocatis, vertice latiore etc.; media prothoracis parte brevior latioreque etc. — *Th. Fleutiauxi* m. ♀ differt orbitis minus verticaliter erectis, fronte intermedia paullo latiore etc.; prothorace angustior multoque minus globoso etc. — *Th. Kraatzi* m. ♂ differt sculptura frontali, orbitis planius divergentibus, vertice pone oculos brevior etc., parte media prothoracis brevior latiore; elytrorum sculptura antice grossior etc.

Therates Waagenorum.

Th. Gestroi m. ♀ *affinis, statura minore; capite paullo graciliore, sulcis longitudinalibus sub basim orbitalium longius posticem versus ductis profundioribusque, fronte centrali inter hos paullo angustiore levigata postice impressionibus 2 punctiformibus ornata, vertice planiore leviterque constricto ante anticum pronoti marginem; hoc transverso in disco non (ad verticem) producto, toto prothorace angustiore, parte media minus globosa; elytrorum signatura testacea simili: lunula humerali valde longiore fere usque ad suturam ducta, deinde hanc paullulum sequente, tum cum parte suturali maculae centralis obliquae (amplioris) confluyente; macula subscutellari paullo majore, apice elytrorum cum apicali suturae parte indistincte flavescente; pedibus dilutioribus, femoribus posticis distaliter obscuratis. — Long. 6 mill. (-ine labro).*

1 ♀: ex collectione magnifica Generalis-Excellentis Equitis Monacensis a Waagen, cuius a fratre — Professore illo praeclarissimo Vindobonensi (paucos ante menses defuncto) — specimina quaedam collecta prope montes Darjeeling. Viventi manibusque mortui species sit data!

Speciminis mei unici tota parte centrali longitudinali capitis (et frontis anticae et interocularis et verticis) testacea.

Th. Chennelli Bat. hat auch 2 punktförmige Eindrücke auf der Hinterstirn, aber schon allein der große Kopf und Vertex läßt keine Verwechslung mit der n. sp. zu. — Von *Th. Kraatzii* m., *Maindroni* m., *Fleutiauxi* m. und *Gestroi* m. unterscheidet sich die neue Art außer manchem anderen durch den glatten sculpturlosen Theil der Interorbital-Stirn, die seitlich von 2 auffallend deutlich und tief eingepprägten und weit nach hinten (bis nahe dem Hinterrande der Orbital-Platten) geführten Furchen eingefasst ist.

Ich entsinne mich, in der reichhaltigen Sammlung seiner Exc. noch 2—3 weitere Ex. dieser niedlichen Species gesehen zu haben, welche den Kopf in geringerer Ausdehnung gelb zeigten: ich glaube sogar, daß diese Gelbfärbung ganz verschwinden kann. Auch die Zeichnung der Fl. unterliegt offenbar großen Schwankungen.

Euryoda Waageni.

Eur. dromicariae Kolbe *similis, differt labro latius nigro marginato, centrali frontis interocularis parte non longitudinaliter rugulosa; pronoti sulcis lineaque longitudinali media profundioribus, disco sat distincte rugoso: rugis ad lineam mediam convergentibus; elytris basim*

versus minus angustatis, apice singulo rotundato, spina paullulum retracta; tota superficie multo densius paulloque subtilius punctulata: sculptura omnino reticulari (interstitiis cribriformibus, solummodo ad marginem paullo latioribus); signatura marginali flava: stria humerali paullo longiore; macula media valde minore, hamulum brevem angustum (perparum clavatum) oblique suturam versus emittente (discum non attingentem!); macula ante-apicali oblonga angusta; tota superficie opaca, aeneo-brunnea, extremo elytrorum margine sat viridicoeruleo micante, serie foveolarum majorum suturae parallela vix metallescente; penultimo palporum maxillarium articulo piceo; metathoracis episternis latioribus; corpore subtus viridescente (perparum violaceo induto). — Long. 14 mill. (sine labro).

1 ♀, Fassoglu (Sudan orient.): specimen unicum liberalissime mihi est datum a clarissimo illo viro, cuius in honorem species est nominata!

Diese Art ist in systematischer Hinsicht dadurch besonders interessant, daß sie die bisher ganz abseits stehende *Euryoda dromicaria* Kolbe den übrigen Species des Genus näher bringt. Die Episternal-Platten der Hinterbrust sind weniger dreieckig und deutlich größer als bei der Kolbe'schen Art (sodafs diejenigen der Mittelbrust noch mehr zurücktreten). Die Fld.-Sculptur macht wegen der schmalen Interstitien und scharf eingestochenen Punkte einen siebförmigen Eindruck.

Euryoda (Megalomma olim) bucephala.

Species huius tribus maxima, robustissima, latissima. Eur. uniguttatae Fairm. paullulum affinis, capite ter crassiore, vertice fere duplo latiore; fronte vix, vertice paullo rugosiore; prothorace multo ampliore, paullo brevior, disco planiore; basi apiceque perparum, parte media multo grossius sculptis: hac granulato-rugosa, juxta lineam mediam longitudinalem leviter breviter transversim striolata; elytris latioribus planioribus, sine impressione ante apicem, apice fere ut basi illius speciei punctato, punctis anticem versus gradatim densioribus grossioribusque; superficie opaca, disco certo visu paullulum obscurato, puncto humerali et anteapicali (in angulo externo apicali) perparvis indistinctis (saepe deficientibus), marginali medio parvo, interdum puncto perparvo in medio disco (perparum magis apicem versus collocato quam hoc marginali) visibili. — Long. 14—15½ mill. (sine labro).

♀♀, Madagascar: Antongil-Bay (Mocquerys).

Labro longo flavo, basi media (fere usque ad discum) viridi; fronte pronotoque opacis viridi cyanescentibus; elytris viridibus opacis vix cyaneo-indutis, margine laterali cyanescente; corpore toto subtus laete cyaneo nitido; palpis¹⁾ (articulo ultimo obscurato), trochanteribus, femoribus (subtus) flavis (his supra cum tibiis et tarsis nigricantibus). Tarsis profunde sulcatis. Antennarum articulis 4 primis nigro-metallicis, ceteris obscuratis.

Stirn, Scheitel und Pronotum sind annähernd gleich grob sculptirt. Der metallische Fleck der Oberlippe gabelt sich vorn in 2 Spitzen. Die Fld.-Sculptur ist überall gut sichtbar, weit spärlicher als bei *Eur. viridi-cyaneae* Flt. und nach hinten zu stark an Tiefe, Größe und Anzahl der Punkte abnehmend. Die kleinere und viel zierlichere *Eur. maxima* Flt. hat die Fld. vorn erheblich dichter und feiner, in der Mitte und dahinter nur wenig dichter punktirt. Besonders auffallend bei der neuen Art ist die plumpe gedrungene Form, der mächtige Kopf, das breite Halsschild etc.

Euryoda reconciliatrix.

Eur. heteromallae McL. affinis, statura majore valdeque robustiore; centrali labri dente longiore; fronte latiore planiore, impressionibus transversis anticis deficientibus, in utroque latere juxta medium arcuato-longitudinaliter impressa, tota fronte inter oculos aequae grosse atque orbitae illius speciei striolata; pronoto brevioris latiore, sulcis antico posticoque profundioribus, parte intermedia evidentius transversim striata; elytris latioribus convexioribus, apice singulo rotundato, tota superficie paullo (praesertim partes marginales pone medium versus) minus dense et grossius (praecipue antice) punctulata; maculis 3 albescentibus: prima ut in illa humerali perparva, secunda in medio paululum magis a margine remota valde majore transversa, tertia ante-apicali rotunda iterum valde majore; coloratione fere eadem, pronoti marginibus lateralibus paullo magis splendidibus, elytrorum lateribus marginalibus latius cyaneo-relucentibus, in tertia parte antica inter hanc partem marginalem et discum laete aurantiaco splendidibus; corpore subtus laetius colorato; penultimo palporum maxillarium articulo flavo; pedibus metallicis, genibus testaceis, tibiis proximaliter brunnescentibus. — Long. 12 mill. (sine labro).

1 ♀, Tenasserim.

Labro obscure-brunnescente, lateraliter testaceo vittato; tarsis sulcatis.

¹⁾ labialium articulo penultimo valde inflato.

Die Fld. sind nicht so plötzlich an den Seiten nach unten gerundet als bei *Eur. heteromalla*. — *Eur. Schmidt-Goebeli* m. ♀ hat eine viel kürzere gelbe O.-Lippe, weniger vorspringende Augen, eine noch flachere (weniger concave) Stirn, die nur seitlich an den weniger breiten Orbital-Theilen grob parallel gestrichelt ist; gewölbteres nach hinten verengtes Halssch., differente Fld.-Makeln, cyanblaues Abdomen etc. — *Euryoda exornata* Schm.-Goeb. et Chd. ♀ hat kürzere gelbe O.-Lippe (besonders Mittelzahn viel kleiner), viel kleineren Kopf, weniger entwickelte Orbital-Theile, differente Stirn-Sculptur etc., ein nach hinten verengtes Pronotum mit weniger parallelen Seiten etc., schmälere Fld., differente Makeln etc. — *Euryoda Bouvieri* m. hat mit der neuen Art schon weniger gemeinsam.

Oxygonia uniformis.

Gracilior et angustior quam ceterae huius generis species (♂); *capite thoraceque opacis cupreo-viridi sordidis, huius marginibus lateralibus cupreo-nitidis; elytris olivaceo-purpurascensibus (certo visu aut purpureo-violaceis aut viridescentibus) sat nitentibus, basi ipsa aureo-splendente; subtus viridi-cuprascente; trochanteribus flavis; elytris maculis 4 marginalibus albis: prima humerali paullulum posticem versus prolongata, secunda posthumerali (striam brevem anticem versus emittente, sed primam non attingente: lunula, ut ita dicam, fere conclusa), tertia majore transversa brevi in medio (non usque ad discum producta) extus angustata intus clavata, quarta in angulo apicali externo majore oblonga. Elytris angustis (maxima latitudine ante apicem) postice fere ut in Ox. gloriola ♂ formata, sed apice extremo non deflexo (ut spina suturalis minus promineat), totis fere aequaliter dense punctatis, solummodo in parte antica punctis paullo rarius insculptis, serie foveolarum pone mediam basim et juxta suturam (usque ad medium) viridi-nicantium valde perspicua. Penis apice clavato-hamato.* — Long. 13 mill. (sine labro).

1 ♂, Ecuador.

Capite thoraceque valde gracilibus (magis quam in *Ox. Batesi* m. ♀), labro nigro maculis 2 latis flavis ornato; fronte antica indistincte (fere levigata) sculpta, inter oculos multo profundius excavata quam in hac ♀, fovea centrali evidenti, orbitis cum oculis magis prominentibus, parte media et vertice paullo subtilius sculptis; thorace longiore angustiore, maxima latitudine pone medium, superficie subtilius striolata, parte intermedia fere levigata (solummodo juxta lineam mediam longitudinalem levissime striolata),

sulcis transversis minus profundis; elytris valde angustioribus, minus inaequaliter impressis (sed usque ante apicem impressionibus levissimis suturalibus perspicuis), sculptura etc. valde differente (conf. supra!); antennis fere ut in *Ox. carissima* ♂, 3ⁱ et 4ⁱ articuli apice sordide purpureo-tincto; femoribus viridescensibus apicem versus obscuratis; tibiis tarsisque fere nigricantibus; palpis flavis, labialium articulo ultimo, maxillarium articulis 2 ultimis obscuris.

Diese Art steht keiner der bekannten Species besonders nahe. Die kurze, quere, innen verdickte Mittelmakel ist vollkommen symmetrisch auf beiden Seiten. Die Spitze des Penis ist erheblich weniger schlank als bei *Ox. prodiga*, der Haken-Endknopf kürzer und mehr quer gestellt (noch etwas kürzer und weniger schräg gerichtet als bei *Ox. Buckleyi* Bat.). Die Farbe der Fld. kann schwer wiedergegeben werden: ein Gemisch von röthlich-violet und olivgrün changierend. Senkrecht gesehen erscheint der Untergrund fast schwärzlich, jeder Punkt resp. Grube grün schillernd.

Odontochila pentacomioides.

Haec species genus Pentacomiae valde refert. — Long. 10 mill. (sine labro).

1 ♀, St. Paulo.

Labri forma, capitis statura et sculptura fere ut in *Od. margineguttata* Dej.; thorace vix brevior, margine antico in medio minus prolongato, lateribus pone medium minus convergentibus, basi ipsa distincte angustata; elytris brevioribus. Labro, antennis (articulis 8—11 obscuratis, 3ⁱ et 4ⁱ apice anguste et leviter metallice inflato), palpis (articulo ultimo vix obscuriore), pedibus totis (femoribus ante apicem paullo obscurius annulatis), trochanteribus flavis; corpore toto nudo (margine laterali coxarum posticarum dense piloso), supra ut in *Pentacomia chrysamma* Bat. tincto, subtus virescente-aeneo; elytris maculis 3 marginalibus flavis ornatis: prima oblonga humerali (breviore sed latiore quam in *Od. brasiliensi* Dej.), altera in medio sat magna fere triangulari, tertia ante apicem parva. Fronte pronotoque opacis, elytris paullulum sericeo-micantibus (partibus centralibus certo visu obscurioribus), corpore subtus laete splendente.

Die Epipeuren der Fld. sind bei meinem einzigen Ex. völlig kahl! Kopf und Halssch. zeigen den gewöhnlichen *Odontochilen*-Typus; die Fld. weisen keine Protuberanzen noch Spiegel auf. Die 2 vorderen Randflecke sind verhältnißmäßig groß, doch verlängert sich der mittlere nicht bis zur Scheibe derselben. Die

Basis des Pronotum ist matt und deutlich seitlich durch eine Verengerung markirt (vom Mittelstück des Halssch. abgesetzt), während z. B. bei *Od. marginiguttata* Dej. die Seitenränder gleichmäßig bis zum Hinterrande des Halssch. convergiren. Die Färbung erinnert ganz auffallend an *Pentacomia chrysamma* Bat. und Verwandte. Im Genus *Odontochila* steht diese Art ganz isolirt. Die Seitenränder der Fld. sind nicht glänzend.

Odontochila cyaneomarginata.

(Chaud. in litt., Catal. Coll. Cic. 1865, p. 18).

Od. viridi Dej. (et var. *virenti* Brl.) *simillima, minus elongata; labro* ♀♂ *toto viridi splendente, ♂ posticem versus minus subito angustato (pone dentes 3 centrales latiore); elytris brevioribus, perparum subtilius punctatis, margine cyaneo angustiore et paululum minus levigato; corpore subtus viridi lucente, solummodo hinc inde cyaneo-induto; ♀ penultimo palporum maxillarium articulo flavo; maculis albis elytrorum deficientibus, interdum humero puncto (aut stria) marginali parvo albo-flavescente ornato.* — Long. 11—12 mill. (sine labro).

♀♂, Espirito Santo, Rio Janeiro (San Fidelis), Minas Geraës (Philadelphia).

Das Pronotum ist durchschnittlich etwas undeutlicher quer gestrichelt als bei *Od. viridis* Dej., seine Querfurchen häufig seichter, seine Seitenränder vielleicht auch etwas weniger gerundet. Die Zähnelung des Spitzenrandes der Fld. scheint meist deutlicher ausgesprochen zu sein.

Cicindela Io.

Cicind. pupilligeræ Chd. *affinis; labro* ♂ *in medio paululum producto-sinuato et dente valida, ♀ valde brevior angusto, antice recte truncato, dente centrali multo longiore (longissima!) ornato; fronte densius usque ad orbitarum cristam longitudinaliter striolata; prothorace paullo planiore, ♂ postice paullo, ♀ multo minus constricto, spatio inter sulcum basalem et marginem posticum latiore, ♀ angulis lateralibus posticis prominentibus; elytris paullo latioribus, pruinoso-opacis, castaneo-brunnescentibus, margine laterali coeruleo (post humerum et ante apicem interrupto): ad humeros sat lato, ante medium triangulariter dilatato intusque producto, pone medium et ad apicem angustato, spina suturali longa, superficie tota subtiliter punctata, foveis nonnullis magnis coeruleis pone mediam basim et in serie flexuosa juxta suturam collocatis; signatura sat differente: puncto humerali rufescente, posthumerali paullo transverso (ut ceteris albo),*

centrali parvo in medio disco posito, ante apicali superiore (fere ut in illa specie a margine remoto), apicali inferiore triangulari oblongo in angulo externo sito (non spinam versus descendente); ♀ speculo sat magno perparum micante viridi-coeruleo in disco antico (suturae approximato) ornata. — Long. 7 mill.

1 ♀♂, Milne Bay (N. Guinea).

Capite nudo cyaneo ant coeruleo; clypeo viridi; pronoto viridi-violaceo-cyanescente, solummodo ad margines laterales sparsim piloso; pectore viridescente sat dense piloso (parte centrali nuda); abdomine violaceo, apice summo testaceo (♀ segmento quinto in disco anguste flavo maculato), sat piloso: basi discoque totis nudis; labro, palpis (articulo ultimo metallico), trochanteribus flavis; antennarum articulo primo testaceo brunnescente, 2^o—4^o cyaneo-indutis (ante apicem purpurascens annulatis), sequentibus obscuris, femoribus testaceo-metallescentibus, tibiis tarsisque cyanescentibus.

Die ganzen Orbitalplatten bis hinauf zum Rande sind dicht gestrichelt. Der lange und etwas schräg nach oben gerichtete Nahtdorn ist bemerkenswerth. Der Oberlippen-Zahn ♀ ganz abnorm lang. Das Pronotum ♀ hinten nur sehr wenig verengt (Basalfurche am Rande aber deutlich ausgeprägt), die Hinterecken der (auch beim ♂) ziemlich stark entwickelten Basalparthie beim ♀ stumpf vorspringend.

Cicindela Bouchardi.

E tribu Cic. longipalpis m., catoptroides m., Gestroi m., maxillaris m. Differt a C. longipalpi m. (♀ a ♀) labro paullo latiore, antice minus recte truncato, dimidia parte basali virescente, oculis valde minus prominulis, vertice non striolato; prothorace longiore angustioreque, lateribus rectoribus, basim versus perparum, apicem versus paullo magis quam ad basim angustato, tota superficie sine striolis transversis (subtilissime sculpta), marginibus lateralibus densius pilosis, basi parce pilosa; elytris paullo angustioribus, singulo apice rotundato (spina retracta), totis magis grisescentibus sat pruinosi, angulo humerali et margine apicali perparum nitentibus (sed clarioribus quam disco), sculptura magis visibili (sed non grossiore), puncto flavescens humerali nullo, speculo discoidali a sutura magis quam a margine distante; capite thoraceque opacis, sordide viridi-aenescentibus; palporum maxillarium articulo 2^o et 3^o viridi-indutis; pubescentia subtus densiore longioreque; femoribus tibiisque aeneo-viridibus. — Long. 7½ mill.

1 ♀, Sumatra: a Dom. Bouchard mihi data (species arborea celerrime volans).

Cicind. catoptrioidis m. capite pronotoque splendentibus, hoc minore convexiore anticem et posticem versus magis angustato (lateribus magis rotundatis), solummodo ad margines laterales (sparsim) piloso; humeris margineque apicali elytrorum minus opacis (sat nitidulis), elytris paullo angustioribus magisque parallelis, virescentibus, apice singulo latius rotundato spinaque suturali minus retracta, sculptura post medium minus visibili, 2^o et 3^o palporum maxillarium articulo flavis; corpore subtus sparsius piloso. — *Cic. Gestroi* m. ♀ differt colore; capite, prothorace, elytrorum humeris magis nitidulis; pronoto paullo brevior, antice latiore, post medium magis rotundato-angustato (lateribus magis arcuatis), lateraliter sparsissime piloso, basi nuda; spina suturali longiore minusque retracta, speculo ampliore magisque splendente; palporum maxillarium articulo 2^o et 3^o flavis; corpore subtus minus dense piloso.

Cicindela melancholica F. subsp. *albomarginalis*.

(syn. congrua Chld. Rev. Mag. Zool. 1878, p. 71.)

Differt a subspecie *trilunari* Klg. magnitudine paullo minore; oculis magis prominentibus; prothorace ♂ angustiore, ♀ postice non dilatato sed parallelo aut perparum angustato; elytrorum margine apicali indistinctius serrulato, signatura alba dilatata et ad marginem (ab humero usque ad spinam suturalem) confluyente: superiore lunulae apicalis parte in hoc margine albo plus minusve discrepante. — Long. 8½ — 11 mill.

♀♂, Sansibar et Africa orientalis germanica: frequentissima!

In der Zeichnung kommen alle Uebergänge zur typischen var. *trilunaris* vor. Meist ist der weisse Fld.-Rand hinter der Mitte so breit, daß der obere senkrecht zum Rande gestellte Theil der Spitzenlunula ganz darin verschwindet. Die Farbe variirt zwischen erzfarben und schwarz.

Cicindela kaleea Bat. subsp. *humeralis*.

Differt a typo statura angustiore; labro paullo magis producto in medio; strüs juxta-orbitalibus vix subtilioribus; prothorace perparum angustiore, lateribus etiam rectoribus, strangulatione basali apicali levioribus, ut pronotum valde cylindricum videatur, marginibus lateralibus impunctatis non pilosis (?); elytris longioribus, subtilius paulloque levius punctulatis, spina suturali brevior, signatura tenui: lunula humerali fere usque ad punctum anticum discoidalem (a sutura magis

remotum) ducta, stria marginali ante medium initium capiente et usque ad tertiam partem apicalem ducta: antice hamulum brevem in directione (obliqua) puncti discoïdalis posterioris (perparvi) emittente, antica lunulae apicalis parte angustiore; episternis totis nudis, sterno fere nudo, abdomine valde subtilius brevius rarius piloso (pilis vix visibilibus). — Long. 9 mill.

1 ♀, Riu-Kiu-Insulae.

Trotz aller Differenzen wohl schwerlich als eigene Art zu betrachten. Die Behaarung¹⁾ ist zwar recht reducirt, dürfte aber individuell resp. abgerieben sein (weder am Pro- noch Mesothorax kann ich etwas von Borsten etc. etc. entdecken). Am Metathorax zeigt das Sternum einige sehr feine (kaum sichtbare) Börstchen! Der freie laterale Rand der Hinterhüften ist ziemlich dicht beborstet. Das Abdomen seitlich nach der Basis zu nackt, sonst überaus fein (kaum wahrnehmbar) und kurz beborstet. Der Prothorax ist auffallend cylindrisch, die seitlichen Strangulationen an der Basis und Spitze äußerst schwach markirt. Oberseite schmutzig grünlich erzfärbt, Kopf und Halsschild etwas mehr kupferig.

Cicindela Waterhousi.

Cic. Dormeri m. valde affinis, perparum major, labro flavo antice in medio minus producto (fere recte truncato); oculis paullo minus prominentibus, fronte centrali vix planiore, vittis 2 centralibus longitudinalibus cyaneis deficientibus; prothorace perparum latiore, anticem versus paullo angustato, lateribus minus rectis, disco juxta lineam mediam valde minus evidenter transversim striolato, toto pronoto (praesertim ad margines laterales) multo minus splendente (fere opaco); elytris opacis, in disco non velutinis, superficie tota aequaliter subtiliter punctata (punctis omnino visibilibus), sutura margineque non micantibus, angulo humerali (♀) late laete splendente, speculo (grossius punctato) in disco antico suturae multo magis approximato valde majore, apice (singulo) extremo sat rotundato (sed spina non retracta), puncto albescente medio fere rotundo, postico longius a spina remoto; corpore subtus cupreo-aenescente, malis episternisque pro- et mesothoracis plus minusve cyanescentibus. — Long. 9 mill.

1 ♀, Ceylon: a Museo Britannico (Dom. Waterhouse) accepta.

Die glänzende Schulterecke tritt bei dem im übrigen matten Fld.-Rande stärker als bei *Cic. Dormeri* ♀ hervor. — *Cic. Ganglbaueri* m. steht der nov. spec. schon etwas weniger nahe.

¹⁾ Vorläufig kann ich daher keinerlei Schwierigkeit hinsichtlich meiner Systematik erblicken: man warte besseres Material ab!

Cicindela Putzeysi.

Cic. infuscatae Qued. paullulum affinis, differt magnitudine valde majore; capite thoraceque multo grossius quam pronoto illius speciei rugosis; elytris paullo sparsius valdeque grossius punctatis, punctis singulis semper separatis (nusquam confluentibus), pone mediam basin et juxta suturam serie foveolarum viridi-micantium sat magnarum, margine solummodo ab humeris usque ante medium deflexo, a medio usque ad apicem applanato, apice non rotundato-truncato, angulo suturali recto; punctis 2 sat parvis flavis in singulo elytro: altero in disco vix pone medium (vitta nigra circumcincta), altero in angulo externo apicali sito (margini approximato); abdomine lateraliter sat dense piloso (apice nudo). — Long. 12 mill. (sine labro).

1 ♂, Angola.

Labro flavo sat longo, antice fere recte truncato, dente una centrali brevi; primo antennarum articulo cum capite toto nudo; fronte antica in medio transversaliter, ad latera longitudinaliter striata, inter oculos fere plana et omnino rugata (lateraliter in directione longitudinali, in disco obliqua), vertice subtilius rugoso quam fronte; pronoto aequae grosse atque hac inter oculos sculpto (granulato, rugis deficientibus), basi paullo magis quam apice angustata, lateribus fere rectis, sulcis obliterated, superficie parum convexa et tota (disco sparsim) pilosa; elytris planis, margine apicali subtiliter serrulato; palpis flavis (articulo ultimo nigro-metallico), labialium articulo penultimo paullo incrassato; pectoris lateribus totis (cum coxarum posticarum margine laterali) pilosis. Corpore supra cupreo-brunneo opaco; 4 primis antennarum articulis et femoribus cuprascentibus; tibiis metallice variegatis, perparum testaceo-transparentibus; tarsis viridi-cyaneis; trochanteribus posticis nigricantibus; abdomine toto coeruleo (cum mediali pectoris parte); pectoris lateribus et malis cupreis.

Cicindela circumpectoides.

Cic. austromontanae Bat. (incognitae m.) similis, differt antico pronoti margine in medio valde producto, marginibus lateralibus vix minus arcuatis; elytris paullo angustioribus convexioribusque, minus dense valde levius (insculpto-) punctatis; foveolis majoribus viridi-metallescentibus non solum in serie suturae parallela collocatis, sed etiam hinc inde irregulariter dispersis; signatura paullo latiore, margine toto ab humero usque ad spinam suturalem albo et cristae marginali ipsi magis approximato, hamulo post-humerali a basi minus distante quam in illa specie, stria transversa in medio sat brevior et

vix posticem versus inclinata, parte superiore (ut ita dicam) lunulae apicalis cum margine magis rotundate-confluente. — Long. 10 mill.

1 ♂, „Oceania“ (patria exacta ignota: verisimillime Nova-Zeelandia).

Sculptura capitis thoracisque et pubescentia totius corporis ut in *C. austromontana* Bat. Colore paullulum minus opaco obscuro. Signatura *Cic. circumpictam* Laf. (America borealis) refert.

Cicindela laticornis.

Differt a *Cic. Kolbei* m. statura valde minore, labro multo longiore et 5 dentato; thorace paullo brevioris latioreque, lateribus magis rotundatis (minus rectis), marginibus episternorum minus reflexis, protuberantia in angulo laterali postico sita minore; elytris multo minus ovalibus, humeris valde latioribus, in medio multo minus dilatatis (apice in specimine unico deficiente), punctis impressis minoribus paullo densioribus, valde irregulariter positihinc inde in lineis longitudinalibus collocatis. Signatura alba valde dissimili: puncto parvo in angulo humerali et juxta scutellum posito, linea angusta suturali ab hac fere usque ad medium ducta, stria marginali tenui paene cum puncto humerali connexa in tertia parte apicali dilacerata et paullulum discum versus flexa, ut cum macula (sat parva et paullulum irregulari) discoidali (in quarta parte apicali collocata) fere connata sit, stria apicali marginali tenui in quarta parte postica, puncto perparvo (vix visibili) discoidali in tertia parte antica (inter lineam suturalem et marginalem) posito. — Long. 16 mill. (sine labro).

1 ♀, interiores Africae Orientalis Germanicae partes.

Labro nigro in disco late flavo. Antennis foliaceis. Pubescentia tota, coloratione corporis inferioris, sculptura capitis thoracisque ut in *Cic. Kolbei* m. Superficie paullulum magis brunnescente.

Die Zeichnung ist vermuthlich auferordentlich variationsfähig: sicherlich kann der ganze Rand zusammenhängend weiß werden. Bei meinem leider sehr stark zerbrochenen Exemplar ist er hinter der Schulter, vor und hinter der Mitte schmal unterbrochen. Die Art nimmt in systematischer Hinsicht eine sehr wichtige Stelle ein, da sie die bisher ganz isolirt stehende *Cic. Kolbei* m. mit den echten Cicindelen vereinigt. Es sind (besonders in der Fld.-Zeichnung) erhebliche Anklänge an *Cic. miseranda* m. vorhanden etc.

Cicindela Neumanni Kolbe subsp. *pseudosoa*.

Differt a typo labro multo brevioris; oculis minus prominentibus; prothorace paullo longiore; elytrorum apice multo longius angustato

minusque rotundato; signatura valde differente: linea tenui marginali integra ab humero usque ad apicem ducta intus nulla aut perparva lunularum etc. vestigia ferente; punctis 4 subsuturalibus, quorum 2 ultimis magis a basi remotis, penultimo magnitudine sat magno. — Long. 17—19 mill.

♀♂, Usaramo (Africa Or. Germ.): a Bennigsen collecta.

Die Entfernung der weißen Marginallinie vom Rande variiert nicht unbedeutend. Die Länge der Oberlippe schwankt sehr. Die Kopfsulptur ist bisweilen etwas gröber. Manchmal ist nur die äußere Hälfte des letzten Kiefertaster-Gliedes metallisch, in anderen Fällen die beiden letzten Glieder. Der obere Apicalfleck springt nur undeutlich aus der Randlinie hervor. Die Fld. erscheinen nicht unerheblich länger als beim Typus.

Cicindela (Calochroa) angulicollis.

Species inter Cic. principem Vig. et Shivahm Parry; differt ab illa statura valde longiore angustiore; labro ad mediam basim triangulariter flavo-maculato; pronoti lateribus minus rotundatis, in parte media ipsa fere rectis, pone strangulationem apicalem angulo fere recto sat obtuse prominente: maxima latitudine prothoracis in huius anguli apice sita; elytrorum sculptura (oculo armato) non perspicua, macula humerali aliquanto minore quam in typica C. principe V. minusque quadrata (confer infra!), multo brevior quam in subspecie ducali m., fascia media transversa magis apicem versus collocata, angustior et longe ante suturam abbreviata, stria parva oblonga apicali perparum latiore et paullo longius ante spinam suturalem evanescente; angulo laterali postico partis mediae metathoracis cum margine laterali attingente coxae posticae dense piloso; femoribus laetius cyanescentibus. — Long. 21 mill. (sine labro).

1 ♀, India orient. (Dacca).

Differt a *Cic. Shivah P.* labro flavo-maculato; prothorace valde angustiore (confer supra!) ad marginem non piloso; elytris paullo latioribus, non perspicue sculptis, angulo suturali recto-acuto (non rotundato); macula humerali vix minore, sed pone angulum humeralem ipsum a margine iam secedente itemque basim elytrorum minus longe sequente, intus semilunariter excisa posticeque late rotundata; fascia media valde magis apicem versus posita, ad marginem et ante suturam paullulum angustata (nec dilatata!), macula apicali minore angustiore ab angulo suturali distante; corpore infra nudo (ante coxas intermedias setis quibusdam ornato et parte late-

rali postico metathoracis cum margine laterali coxarum posticarum dense piloso); palpis totis nigris.

Corpore supra nigro opaco (elytris velutinis); subtus nigricante perparum hinc inde metallice induto, modice nitente.

Das Mittelstück des Halssch. verbreitert sich vor der Basal-Strangulation erst etwas, verläuft darauf nahezu gerade nach vorn und bildet dann dicht vor der Apicalfurche einen deutlich vorspringenden stumpfen Winkel.

Myrmecoptera micans.

Myrm. Gunningi Pér. *simillima*, differt (♀ a ♀) *plicis transversis in summo vertice non levigatis; prothorace paullo brevioris latiore, supra (praesertim parte media disci et marginis antici et basis) profundius plicato; elytris brevioribus antice minus angustatis (summa latitudine in medio); costis 5 medialibus paullo brevioribus (minus apicem versus ductis), rectoribus, valde minus irregulariter hinc inde flexuosis, magis prominentibus acutioribusque, laterali sexta antice magis abbreviata et solummodo in parte media elytrorum perspicua, septis transversis inter suturam et primam costam, inter secundam et tertiam, inter quartam et quintam profundioribus et multo regularioribus; intervallo intercostali primo et tertio (praesertim illo) foveis maximis ornato, sed saepius quam in Myrm. Gunningi P. hinc inde septis transversis interrupto; parte apicali paullo densius punctato et leviter micante; superficie cetera fere tota nigra sat opaca (hinc inde, praesertim ad margines paullulum aenescente); palporum maxillarium articulo penultimo flavo. — Long. 19—21 mill.*

♀♂, Komatipoort (Hartmann: Transvaal).

Myrm. clathratae Klg. ♂ (= *gigantea* Br. ♀) iterum affinis; ♀ differt a *Myrm. gigantea* Br. media labri dente valde brevioris (3 centralibus fere magnitudine aequalibus); toris in utroque pronoti disco basim versus magis elevatis; elytris (parte apicali densius punctata et paullulum micante excepta) valde profundius grossiusque foveolatis: foveis fere semper septis transversis totum spatium intercostale dividens separatis et (confer supra) plerumque angustis transversis etc. — ♂ differt a *Myrm. clathrata* Klg. toris pronotalibus paullulum levigatis-nitentibus posticeque altioribus, sculptura basis pronoti item fere evanescente, cetera prothoracis superficie subtilius striolata; elytrorum sculptura aequae ac in ♀ differente; spina suturali valde longiore angustiore acuta.

♀♂ Labro nigro in medio anguste flavo-lineato; antennis valde dilatato-applanatis; et pro- et mesosterno ante coxis, metasterno

cum episternis correspondentibus, laterali coxarum posticarum parte sparsius pilosis; elytris immaculatis.

Ob die Differenz in der Pronotal-Sculptur ein secundärer Geschlechtscharakter ist oder nur individuell, muß ich dahingestellt sein lassen.

Myrm. pseudoclathrata P. hat schon wegen seiner viel gleichmäfsiger und feiner in kleine Felder getheilten Intercostal-Räume, der viel feineren und schärferen Rippen etc. nichts Näheres mit der neuen Art gemeinsam. — *Myrm. grandis* P. hat eine centrale Stirngrube und gröber quer gerunzelten Vertex. Das Halssch. ist schmaler, mit glatterer Basis, neben der Mittellinie weniger dicht sculpirt und mehr abgeglättet, Vorderrand in der Mitte nach hinten zu convergirend gefurcht; Fld. länger, nach vorn und hinten mehr verengt; Nahtdorn deutlich, aber nicht lang, sechste Rippe verloschen, alle fünf weniger scharf entwickelt und weniger gerade gerichtet, die vierte und fünfte genähert. Die Intercostal-Räume sind bei der neuen Art regelmäfsiger als dort durch quere Septa getrennt, nur der zweite mit einigen großen dazwischen gestreuten Gruben, der vierte mit kleineren und spärlicheren. Alle Rippen bei meiner Art weniger weit nach hinten reichend. Apicaltheil etwas seichter und dichter punktirt, dabei schwach glänzend. Brust weniger dicht behaart.

Tetracha Steinheili.

T. cribratae St. *affinis, differt labro brevior in medio non producto, ♀ antice recte truncato, dentibus 2 medianis validis ornato; ♂ antice leviter exciso, dentibus 2 medianis perparvis; thorace paullo angustiore; elytris ♀ pone humeros valde dilatatis (ut elytra basim versus angustata videantur), ♂ vix dilatatis, ante medium (praesertim ♀) paullo rarius punctatis, sculptura in medio fere evanescente, dimidia parte postica levigata, solummodo (praesertim ♂) punctis perparvis sparsim hinc inde impressis; lunula apicali majore antice clavata, suturam latius attingente; elytrorum apice singulo ♀ vix latius rotundato, ♂ minus prolongato, latius truncato (angulo suturali non rotundato sed recto); antennarum articulo 2^o brunneo, 3^o et 4^o ante apicem nigro-annulatis. — Long. 12—13 mill.*

1 ♀♂, Vilcanota (Peru).

Capite thoraceque (ut in *T. cribrata*) paullulum rugosis. Superficie nitente. Fronte pronotoque aeneo-viridibus, illa clara, hoc obscuro (praesertim disco); elytris pone medium fere nigris, ante medium lateraliter sat laete viridescens, medialiter cyaneo-nigricantibus.

Wegen der in der Mitte der Fld. fast erlöschenden Sculptur steht die Art auch den Species *Tetr. distinguenda* Dej., *Camposi* m. und *Thomsoni* m. etwas näher. — *Tetr. distinguenda* Dej. ist viel plumper gebaut, Kopf und Hlssch. erheblich breiter (auch glatter); Fld. ohne Erweiterung beim ♀ hinter den Schultern, mit spärlicherer und gröberer Sculptur bis zur Mitte; Fld.-Spitze ♂ abgerundet, ♀ stärker gerundet; Form der O.-Lippe etc. — *T. Camposi* m. weist dieselben Unterschiede auf, nur ist die Fld.-Sculptur vor der Mitte ganz auffallend viel spärlicher und feiner, hinter der Mitte ganz fehlend; Nahtwinkel ♂ weniger, ♀ stärker rechtwinklig. Außerdem ist *T. Camposi* m. erheblich gröfser, Fld. gewölbter, die Oberseite blau etc., während *T. Steinheili* eine zierliche Art ist etc. — Mein einziges ♀ von *T. Thomsoni* m. ist gröfser und plumper, glänzend erzgrün, O.-Lippe in der Mite (wenn auch nur sehr schwach) etwas vorgezogen, Kopf und Halssch. viel glatter, Fld. hinter der Schulter nicht erweitert und überall spärlicher punktirt, hinten breiter gerundet, einzelne Fld.-Spitze mit rechtwinkligem Nahtwinkel, Spitzenlunula viel umfangreicher und höher hinaufreichend etc.

Amblyopinus Brandesi Kraatz n. sp.

Eine wenig bekannte, aber recht interessante Staphylinen-Gattung ist das, 1875 von meinem verstorbenen Freunde Hrn. v. Solsky in den Horae Soc. Ent. Rossicae XI, p. 10 aufgestellte Genus *Amblyopinus*, dessen beide Arten parasitisch auf Mäusen in der peruanischen Montana de Chanchamago (in der Hacienda Amabla Maria) im April und Juni 1873 aufgefunden wurden; die Gattung gehört zu den Tachiniden und zeichnet sich durch kurze Fld. und ziemlich lang und abstehend behaarten Hinterleib aus; die kleinere *A. Solskyi* von $6\frac{1}{3}$ mill. Länge wurde mir neuerdings von Hrn. Prof. Brandes in Halle a. S. mitgetheilt, die gröfsere (*Mniszeczü*) wird doppelt so grofs, 14 mill. Eine dritte Art fand ich unter einer Sammlung peruanischer Insekten, die ich von Hrn. Dr. Staudinger erhielt; ich benenne sie Hrn. Prof. Brandes zu Ehren, der mir die *Ambly. Solskyi* verehrte und mit sehr umfassenden Untersuchungen über *Platyphylla castoris* Rits. beschäftigt ist; er wird auch dessen Larve beschreiben.

Amblyopinus Brandesi: *Amblyopino Jelskyi similis et affinis, sed major, capite thoraceque piceis, elytris rufescentibus, antennis longioribus, thoracis basin fere superantibus, abdomine densius punctato et pubescente, pedibus rufis.* — Long. $7\frac{1}{2}$ mill.

Von Callanga (Peru) von Dr. Staudinger erworben.

Dr. G. Kraatz.